

لأفضل حماية  
لمزروعاتكم



كونفيدور®  
OD



Confidor®  
OD

Pour une meilleure  
protection de vos cultures



أفضل نوعية



أكثر حيوية



أكثر قوة



Plus de force



Plus de vigueur



Meilleure qualité



**AgriChem**

Zone d'activité lot n°23, Ain  
Benian, Alger, Algérie  
Tél.: 021 31 01 95  
Fax :021 31 02 34

**Bayer CropScience**

**Bayer Algérie SPA**  
Lot 424-Coopérative El Bouroudj  
Ain Allah-Dely Ibrahim  
**Phone:** +213 21 91 08 23/ **Fax:** +213 21 91 08 93  
**Web:** www.algeria.bayercropscience.com

**Région Est :** R.MESTAR 0770 51 28 78  
R.OUADI 0770 32 86 32  
A.BENAICHA 0770 11 95 96  
**Région Centre :** S.SAAD 0770 30 68 13  
M.A. KACI 0770 32 40 47  
**Région Ouest :** T.TAIBI 0770 78 58 43  
M.A.BELBACHIR 0770 65 08 52  
**Région Sud-Est :** T.LEBKARA 0770 11 96 39



Science For A Better Life



**Substance active :** Imidaclopride  
**Famille chimique :** Chloronicotinyles  
**Formulation :** Dispersion huileuse (OD)  
**Teneur :** 200 g/L  
**Certificat d'homologation N°** 08.46.016

### Modes d'action efficaces :

**Confidor®** est un insecticide de contact et ingestion. Il agit au niveau du système nerveux des insectes par l'imidaclopride, découverte par Bayer CropScience.

Doté d'une action systémique, le produit est absorbé par les feuilles et par les racines (application en goutte à goutte).

### Large spectre d'action

**Confidor®** agit efficacement contre plusieurs ravageurs piqueurs suceurs, en particulier :



Mouches blanches



Pucerons





Cicadelles


### Une formulation innovante

L'efficacité du **Confidor®** est renforcée par une formulation moderne performante (OD : dispersion dans l'huile), découverte par Bayer CropScience.

#### Atouts de la technologie :



- + Une adhésion optimale à la surface des feuilles
- + Une meilleure dispersion et couverture du feuillage
- + Une meilleure pénétration et rétention
- + Une résistance optimale au lessivage
- + Une excellente propriété systémique
- + Une action rapide avec effet de choc




### Doses d'utilisation

Cultures	Ravageurs	Doses	D.A.R*
Cultures maraîchères	Mouches blanches	50 ml/hl soit 0,5L/ha	7 jours
	Pucerons	30 ml/hl soit 0,3L/ha	
Arbres fruitiers	Pucerons	30 ml/hl soit 0,3L/ha	14 jours
Vigne	Cicadelles	30 ml/hl soit 0,3L/ha	14 jours

- \* : Délai avant récolte
- Adapter le volume de la bouillie en fonction de la culture et du couvert végétal
  - En moyenne, le volume de bouillie est de :
    - 1000 L/ha en cultures pérennes
    - 400 à 600 L/ha en cultures maraîchères

### Effet « Stress Shield »

En plus de son excellent effet insecticide, **Confidor®** possède la particularité de conférer aux plantes une bonne tolérance aux stress abiotiques (sécheresse, lumière, salinité..ect) se traduisant par une stimulation générale de la physiologie du végétal :





En arboriculture fruitière : **Confidor**® offre le meilleur développement végétatif et une rigueur racinaire soutenue

على أشجار الفاكهة : يوفر كونفيدور® نمو خضريا و جذريا ممتازا و قويا

Plants de tomate dans une solution nutritive : **Confidor**® favorise le développement racinaire

Champ de melon : **Confidor**® améliore la croissance végétative

نباتات الطماطم في محلول مغذي : يحفز كونفيدور® نمو الجذور

حقل البطيخ : يحفز كونفيدور® النمو الخضري للنبات

## Recommandations

- + Alternance des traitements avec des produits à modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance.
- + Ne pas utiliser **Confidor**® pendant la floraison et la période de butinage. Privilégier des applications en pré-floraison ( Jusqu'à 2 à 3 semaines avant début floraison) ou en post-floraison jusqu'à récolte. Se référer aux programmes de traitement de BCS.
- + Pour assurer une efficacité optimale du **Confidor**®, il est conseillé de traiter dès le début d'attaque, tout en assurant une bonne pulvérisation.

## Conseils d'utilisation :

Lors du stockage, un phénomène de « déphasage » peut se produire. Il est totalement réversible.

→ Avant toute application, secouez le flacon.



- ## توجيهات
- + يجب تطبيق التناوب في إستعمال مبيدات ذات طرق تأثير مختلفة من أجل تجنب ظاهرة المقاومة.
  - + لا يسمح باستعمال كونفيدور® خلال مراحل الإزهار و جني الرحيق. يجب تطبيقه في مراحل قبل الإزهار ( حتى 2 إلى 3 أسابيع قبل بداية الإزهار) أو بعد مرحلة الإزهار حتى الجني. ينصح بمطالعة برامج المعالجة لبايير كروب ساينس .
  - + من أجل الحصول على فعالية تامة خلال استعمال كونفيدور® يرجى تطبيقه عند بداية ظهور أولى الحشرات . مع تأمين رش كاف خلال المعالجة .

## نصائح الإستعمال

خلال عملية التخزين يمكن أن يحصل فصل في هيئة المبيد (صعود الطبقة الزيتية). تتلاشى هذه الظاهرة بمجرد إجراء الرج.

← قبل الاستعمال، يرجى الرج الجيد للعبوة.



## مقادير الاستعمال

م.ق.ج.*	المقدار	الحشرات المستهدفة	المحاصيل
7 أيام	50 مل/هكتار أي 0.5 ل/الهكتار	الذبابة البيضاء	الخضروات
	30 مل/هكتار أي 0.3 ل/الهكتار	المن	
14 أيام	30 مل/هكتار أي 0.3 ل/الهكتار	المن	الأشجار المثمرة
14 أيام	30 مل/هكتار أي 0.3 ل/الهكتار	حشرة الزيز (السيكاديل)	الكروم (الدالية)

- \* مدة ما قبل الجني
- يرجى ضبط حجم العصيدة على حسب المحصول و كثافته
  - يتم تحضير العصيدة بمعدل :  
- 1000 ل/الهكتار على الأشجار المثمرة و الكروم (الدالية)  
- 400 إلى 600 ل/الهكتار على الخضروات

## خاصية المقاومة للعوامل المؤثرة

إضافة إلى تأثيره الممتاز على مختلف الحشرات، يمنح كونفيدور® النباتات المعالجة القدرة على مقاومة مختلف العوامل المؤثرة سلبياً و المرتبطة بالمناخ و التربة (الجفاف، الضوء، الملوحة... الخ) و ذلك بتنشيط عام لفيزيولوجية النبتة :



## طرق تأثير فعالة

كونفيدور® مبيد حشري يؤثر عن طريق الملامسة و الهضم على الجهاز العصبي للحشرة الضارة. بفضل إמידاكلوبريد، المبتكرة من طرف شركة بايير، يتميز كونفيدور® بالجهازية و يمتص عن طريق الأوراق و الجذور ( عند السقي بالتقطير).

## مجال فعالية واسع

يتميز كونفيدور® بمجال فعالية واسع ضد العديد من الحشرات الثاقبة الماصة، خاصة :



السيكاديل




المن



الذبابة البيضاء

## صيغة مبتكرة

فعالية كونفيدور® مبنية بصيغة جديدة مبتكرة "الانتثار الزيتي" المكتشفة من طرف بايير كروب ساينس. فوائد تكنولوجية OD :



- + إلتصاق جيد على سطح الأوراق
- + إنتشار جيد و تغطية كاملة للجهاز الورقي
- + نفاذية و قدرة حجز جيدة
- + مقاومة جيدة للغسل
- + خاصية جهازية ممتازة
- + فعالية سريعة و خاصة الصدمة

