



فيريتا[®]
فلاش



Verita[®]
FLASH



الحماية ضد الميلايو التي
ترافق نمو محاصيلكم



*La protection contre le mildiou
qui croît avec vos cultures*



AgriChem

Zone d'activité lot n°23, Ain
Benian, Alger, Algérie
Tél.: 021 31 01 95
Fax :021 31 02 34



Bayer CropScience

Bayer Algérie SPA

Lot 424-Coopérative El Bouroudj

Ain Allah-Dely Ibrahim

Phone: +213 21 91 08 23/ Fax: +213 21 91 08 93

Web: www.algeria.bayercropscience.com

Région Est : R.MESTAR 0770 51 28 78
R.OUADI 0770 32 86 32
A.BENAICHA 0770 11 95 96
Région Centre : S.SAAD 0770 30 68 13
M.A. KACI 0770 32 40 47
Région Ouest : T.TAIBI 0770 78 58 43
M.A.BELBACHIR 0770 65 08 52
Région Sud-Est : T.LEBKARA 0770 11 96 39



Science For A Better Life

Substances actives : Fénamidone + Fosétyl Aluminium
Familles chimiques : Imidazolinones et Phosphonates
Teneur : 4,44 % Fénamidone + 66,7 % Fosétyl-Al
Formulation : Granulés dispersibles (WG)
Certificat d'homologation n°: 07 45 163



MODES D' ACTIONS COMPLÉMENTAIRES :

Verita[®] FLASH est un fongicide associant l'effet de deux substances actives à haute performance technique. Il contrôle les différents types de mildiou (*Phytophthora spp*, *Plasmopara spp*, *Peronospora spp*, *Pseudoperonospora spp*).



Dégâts sur vigne



Dégâts sur laitue



Dégâts sur oignon



Dégâts sur tomate



Dégâts sur
concombre

● **La Fénamidone** : substance active présentant des propriétés anti-mildiou remarquables. Grâce à sa rapidité d'action et son effet antisporel, elle contrôle l'infestation durant les périodes à haut risque.

Grâce à son action pénétrante et translaminaire, elle permet une protection des deux faces (inférieure et supérieure) de la feuille.

● **Le Fosétyl Aluminium** : substance active dotée d'une systémie ascendante et descendante. Elle agit préventivement en inhibant la germination des spores et en bloquant le développement du mycélium.

En plus de son activité directe sur la maladie, le Fosétyl-Al stimule les défenses naturelles de la plante.



USAGES HOMOLOGUÉS :

CULTURES	MALADIES	DOSES	D.A.R*
Vigne	Mildiou	1,5 kg/ha	14 jours
Cultures maraîchères	Mildiou	2 kg/ha	7 jours

* : Délai avant récolte

- ➔ Adapter le volume de la bouillie en fonction de la culture et du couvert végétal
- ➔ En moyenne, le volume de bouillie est de :
 - 1000 L/ha en cultures pérennes
 - 400 à 600 L/ha en cultures maraîchères



ATOUTS du Verita[®] FLASH

- Une efficacité de très haut niveau qui permet le contrôle des différents types de mildiou
- Adapté aux périodes de forte croissance et protection des nouvelles pousses grâce à sa double action translaminaire et systémique
- Une protection préventive élevée et constante
 - Sécurité renforcée par une propriété anti-sporulante rapide et ciblée
 - Une persistance d'action de 7 à 14 jours selon la pression de la maladie
- Stimulation des défenses naturelles de la plante
- Bonne activité curative
- Risque atténué de développement de souches résistantes grâce à la combinaison des 2 substances actives
- Une très bonne protection des fruits
- Formulation sécurisée sans poussière, ultra dispersible
 - Moins dépendante des conditions climatiques : meilleure résistance au lessivage



POSITIONNEMENT :

Les traitements sont enclenchés en **préventif** et peuvent s'étaler durant toute la phase de **croissance active** des plantes.



POSITIONNEMENT OPTIMAL SUR VIGNE



Débourrement 9-11 Etalement des feuilles 12-14 Bourgeons floraux 51-53 Bourgeons floraux séparés 55-59 Floraison 61-69 Nouaison 71-77 Fermeture de la grappe 81-85 Maturation 89 Récolte

Verita

Verita



POSITIONNEMENT OPTIMAL SUR TOMATE



Verita[®]
FLASH



RECOMMANDATIONS :

- Intervalle entre deux traitements
 - 10 à 14 jours pour la vigne
 - 7 à 10 jours pour les cultures maraîchères
- Nombre d'applications : 2 à 3 traitements maximum par culture et par année
- Alternier avec des produits appartenant à d'autres familles chimiques à modes d'actions différents




COMPATIBILITÉ :

- Ne pas mélanger avec des produits à base de cuivre, de soufre ou des engrais foliaires contenant de l'azote.
- Eviter le mélange avec des produits à base de zirame ou de mancozebe.

دورة تطوّر الميليديو و تموقع الحماية

Cycle du mildiou et positionnement de la protection



التموقع المرجعي :

تكون المعالجة وقائية و يمكن أن تمتد خلال كل مراحل النمو السريع للنباتات.

← التموقع المرجعي على الكروم



التبرعم 9-11 أوراق ممددة 12-14 ظهور العناقيد 51-53 براعم زهرية منفصلة 55-59 الإزهار 61-69 العقد 71-77 عناقيد مغلقة 81-85 النضج 89 الجني

فيريتا

فيريتا

← التموقع المرجعي على الطماطم



فيريتا
فلاش

توجيهات :

- المدة الفاصلة بين معالجتين :
 - 10 إلى 14 يوم للدالية
 - 7 إلى 10 أيام للخضروات
- عدد التطبيقات : من 2 إلى 3 مرات على الأكثر على المحصول و في السنة
- التناوب مع مواد تنتمي لعائلات كيميائية أخرى ذات طرق تأثير مختلفة

الإنسجام (قابلية الخلط) :

- لا يجب الخلط مع مبيدات تحتوي على النحاس، الكبريت أو الأسمدة الورقية التي تحتوي على الأزوت.
- اجتناب الخلط مع المواد التي تحتوي على الزيرام أو المنكوزيب.

المواد الفعّالة : فيناميدون + فوزيتيل ألومينيوم
العائلات الكيميائية : إيميدازولينون و فوسفانات
التركيز : 4,44 % فيناميدون + 66,7 % فوزيتيل-أل
الهيئة : حبيبات قابلة للذوبان (WG)
رخصة البيع رقم : 07 45 163

الإستعمالات المرخصة :

المحاصيل	الأفة	المقادير	م.ق.ج.*
الكروم (الدالية)	الميلديو	1,5 كغ/هكتار	14 أيام
الخضروات	الميلديو	2 كغ/هكتار	7 يوم

* : مدة ما قبل الجني
يرجى ضبط حجم العصيدة على حسب المحصول و كثافته
يتم تحضير العصيدة بمعدل :
- 1000 ل/الهكتار على الأشجار المثمرة و الكروم (الدالية)
- 400 إلى 600 ل/الهكتار على الخضروات

مزايا فيريتا® فلاش :

- فعالية ممتازة ضد أنواع مختلفة من البياض الزغبي (الميلديو)
- يتلائم مع مراحل النمو القصوى للنبات و يسمح بحماية الأوراق الفتية بفضل فعاليته المزدوجة :
- الانتشار الرقائقي و الجهازية التامة
- حماية وقائية عالية و ثابتة المستوى
- تأمين مشدد بفضل الخاصية المضادة للتبوغ السريعة و المستهدفة
- مدة الفعالية من 7 إلى 14 يوما حسب تأثير المرض
- تحفيز قدرات الدفاع الذاتية للنبات
- فعالية علاجية جيّدة
- تخفيض إحتمال ظهور السلالات المقاومة بفضل إزدواجية عمل مادتين فعّالتين
- حماية ممتازة للمنتوج
- هيئة مؤمنة بدون غبار، ذات قابلية عالية للذوبان
- أقل تأثيرا بعوامل المناخ : مقاومة ممتازة لعملية الغسل

طرق تأثير متكاملة :

فيريتا® فلاش مبيد فطري يجمع تأثير مادتين فعّالتين متميزتين بخصائص تقنية عالية. يراقب أنواع مختلفة من الفطريات المسببة لمرض الميلديو (الفيتوفتورا، البلاسموسبورا، البيرونوسبورا، البسودوبيرونوسبورا).



- **الفيناميدون** : مادة فعّالة تتميز بخصائص ممتازة ضد البياض الزغبي (الميلديو). بفضل سرعة تأثيرها و فعلها المضاد للتبوغ، تتلائم الفيناميدون جيدا مع المراحل ذات الخطورة العالية لظهور العدوى. زيادة على نفاذيتها الممتازة و انتشارها الرقائقي، تؤمن مادة الفيناميدون حماية تامة للجنتين العلوية و السفلية للأوراق المعالجة.
- **الفوزيتيل ألومينيوم** : مادة فعّالة ذات جهازية تامة تصاعدية و تنازلية، تؤثر وقائيا من خلال منعها لإنتاش الأبواغ و توقيفها لنمو المشيج الفطري.
- زيادة على تأثيرها المباشر على المرض، تحفز مادة الفوزيتيل ألومينيوم قدرات الدفاع الذاتية للنباتات.