

رفيقكم لصحة حقولكم



ماديسون®



MADISON®



VOTRE PARTENAIRE POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS CHAMPS

PROVO Mob: 0550 97 00 61 / 63
design E-Mail: promodesign@yahoo.fr

Distributeur



Zone d'activité lot n°23,
Ain Benian, Alger, Algérie
Tél.: 021 31 01 95
Fax :021 31 02 34
Web : www.agrichem.dz



Bayer Algérie SPA
Division CropScience
Lot 424-Coopérative El Bouroudj
Ain Allah-Dely Ibrahim
Tel.: +213 23 30 91 54/ Fax: +213 23 30 91 57
Web : www.algeria.bayercropscience.com

Région Est :	A.DERRADJI	0770 32 86 32
Région Centre :	S.SAAD M.A. KACI	0770 30 68 13 0770 32 40 47
Région Ouest :	T.TAIBI M.A.BELBACHIR A.SADOU	0770 78 58 43 0770 65 08 52 0770 21 01 61


Science for a better life

Deux ingrédients majeurs pour une performance inégalée

المكونات الأساسية لفعالية لا مثيل لها

MADISON® est un nouveau fongicide destiné pour la lutte contre les principales maladies nuisibles aux céréales.

ماديسون® مبيد فطري جديد لمكافحة الأمراض الأساسية التي تصيب محاصيل الحبوب



Mode d'action

La performance du MADISON® est issue d'une combinaison de deux substances actives complémentaires, caractérisées chacune par un effet vert remarquable et un haut niveau d'efficacité :

Prothioconazole

De la famille des triazolinthione, il inhibe la synthèse de l'ergostérol ; il est doté de propriétés systémiques et d'une action préventive et curative. Il se caractérise par son large spectre d'action, sa polyvalence et sa bonne persistance d'action.

من العائلة الكيميائية "تريازولنثيون"، يؤثر عن طريق تثبيط تركيب الستيروول . يتميز بخصائص جهازية، طريقة تأثير وقائية وعلاجية. يتميز بمجال فعالية واسع، بقوة تأثيره ومدة فعالية جيدة .

Trifloxystrobine

De la famille chimique des Oximino-acétates, elle inhibe la respiration cellulaire, dotée de propriétés par mésostémiques qui se traduisent par son absorption par la couche cireuse, sa redistribution par un mouvement de vapeur, puis sa re-déposition et enfin sa diffusion par une activité translaminare à l'intérieur des tissus. De ce fait, elle offre une longue persistance d'action et une protection préventive renforcée sur les maladies foliaires.

من العائلة الكيميائية " أوكسيمينو-أسيتات". تؤثر عن طريق تثبيط التنفس الخلوي. تتميز بخاصية الميزوجهازية، بإمتصاصها من طرف الطبقة الشمعية، بإعادة الإنتشار بحركة بخارية سطحية ثم إعادة الترسيب و بالنفاذ عبر الأنسجة من خلال الإنتشار الرقائق . و بهذا تقدّم مدة فعالية طويلة و حماية وقائية مدعّمة على الأمرا ض الورقية.


بروتيوكونازول

طريقة التأثير

تُستمد نجاعة ماديسون® من مزيج مادتين فعالتين متكاملتين، تتميزان كل منهما من مستوى عالي من الفعالية و زيادة متميزة في الإخضرار :

تريفلوكسيستروبين

Large spectre d'action



مجال واسع الفعالية


Une solution performante pour un maximum d'efficacité

حلّ ذو نجاعة للسيطرة القصوى على الأمراض

Une performance prouvée

فعالية مؤكدة


RÉSULTATS D'ESSAIS – TUNISIE 2012



Résultats d'efficacité et rendement
Stade d'appl. BBCH 55 (mi-épiaison)

Cible: Septoriose

RÉSULTATS D'ESSAIS – TUNISIE 2014




Résultats d'efficacité
Stade d'appl. BBCH 55 (mi-épiaison)

Cible: Septoriose et Rouille

نتائج التجارب - تونس 2014

المنطقة : تيرسوق




الهدف : السبتيوروز و الصدأ

نتائج الفعالية

مرحلة التطبيق BBCH 55 (منتصف الإسبال)

نتائج التجارب - تونس 2012

المنطقة : ماطر ، باجة و بنزرت



الهدف : السبتيوروز

نتائج الفعالية و المردود

مرحلة التطبيق BBCH 55 (منتصف الإسبال)

Recommandations

توصيات الاستعمال

- **Nombre d'application** : 1 ou 2 fois par saison
- **Intervalle entre 2 applications** : 14 jours
- **Stade d'application** :
Blé : début montaison à fin floraison (BBCH 30 - 31 à BBCH 69)
Orge : début montaison à début floraison (BBCH 30 - 31 à BBCH 61)
- Le produit doit être appliqué à la dose homologuée et dans un volume de pulvérisation suffisant pour réaliser une couverture uniforme.
- Il est interdit d'utiliser **Madison®** avec un matériel à manipuler manuellement ou par pulvérisateur à dos.
- Éviter de traiter en cas de stress hydrique marqué et ou de fortes amplitudes thermiques (15 - 17°C).
- Si les températures maximales excèdent 25°C, privilégier un traitement tôt le matin ou tard le soir
- **Volume de bouillie** : 300 à 400 L/ha.

- **عدد المعالجات** : 1 أو 2 في الموسم
- **فترة الانتظار بين معالجتين** : 14 يوم
- **مرحلة المعالجة** :

- **القمح** : من مرحلة بداية الاستطالة إلى نهاية الازهار (BBCH 30 - 31 إلى BBCH 69)
- **الشعير** : من مرحلة بداية الاستطالة إلى بداية الازهار (BBCH 30 - 31 إلى BBCH 61)
- يجب تطبيق المبيد بالمقدار المرخص به و في حجم كافي من العصيدة لتشكيل تغطية متجانسة
- يمنع استعمال **ماديسون®** عن طريق آلة الرش اليدوية وآلة الرش الظهرية
- تفادي المعالجة في حالة وطاء مائة أو في حالات الاتساع القوي للحرارة (15 - 17°C).
- عندما تفوق درجات الحرارة 25°C، ينصح بالمعالجة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل
- **حجم الماء الموصي استعماله** : 300 - 400 لتر في الهكتار

Une solution polyvalente et sûre pour un champ sain

حل كامل و أكيد لحقل صحي

Un positionnement flexible

Positionnement du Madison® dans un programme de traitement

تموقع ماديسون® في برنامج المعالجة ضد الأمراض الفطرية

مرونة في الإستعمال

- Appliqué au stade "dernière feuille étalée", Madison® permet de protéger les feuilles contre : septoriose, rouilles et helminthosporiose

Programme à 1 seul traitement
« faible pression de maladies »

- En complément d'un autre fongicide appliqué à l'épiaison/début floraison tel que PROSARO®, pour une protection préventive accrue y compris contre l'oïdium et un bon contrôle des maladies de l'épi.

Programme à 2 traitements
« pression moyenne à forte des maladies des feuilles et de l'épi »

- En relai, avec un autre fongicide appliqué au stade 2 nœuds/sortie dernière feuille étalée pour une meilleure persistance d'action et un effet vert additionnel

Programme à 2 traitements
« pression moyenne à forte des maladies des feuilles »

برنامج لمعالجة واحدة
"درجة الإصابة ضعيفة"


برنامج لمعالجتين
"درجة الإصابة متوسطة إلى قوية على الأوراق و السنابل"

برنامج لمعالجتين
"درجة الإصابة متوسطة إلى قوية على الأوراق"

- تطبيق ماديسون في مرحلة "آخر ورقة متطاولة", يسمح بحماية الأوراق ضد السبوتوريا، الصدأ و الهلمنتوسبوريز .

- بالإضافة إلى تطبيق مبيد فطري آخر كالبروزارو® في مرحلة الإنبال/ بداية الإزهار، لحماية وقائية قوية حتى ضد أليياض الدقيقي و تحكم جيد في أمراض السنابل .

- بالتتابع مع تطبيق مبيد فطري في مرحلة 2.1 عقدة/ ظهور الورقة الأخيرة لتمديد الحماية، مدة فعالية طويلة المدى و زيادة في الاخضرار.



De nombreux avantages pour le céréaliculteur

فوائد كثيرة لمزارعي الحبوب

Un large spectre d'action

Un excellent effet vert

Une formulation pratique

Une persistance d'action

Une flexibilité d'utilisation



Une solution polyvalente

Un gain en rendement

Une sécurité et un confort

Un gain de temps

Un bon partenaire dans un programme de traitement

حل كامل

زيادة في المردود

ضمان و راحة

ربح في الوقت

رفيق جيد في برنامج المعالجة



مجال فعالية واسع

زيادة متميزة في الاخضرار

صيغة سهلة الإستعمال

مدة فعالية جيدة

مرونة في الإستعمال